



ANNEXE N° 2

Conseils aux professionnels de santé

Mesures d'hygiène spécifiques à prendre lors de la prise en charge d'un enfant pour la COVID-19

Il s'agit de prendre en plus des précautions standards, des précautions complémentaires de type « contact » et « air ».

1. **Pour le patient** : après friction des mains avec une solution hydroalcoolique, lui demander de revêtir un masque chirurgical et l'informer de la nécessité des mesures de protection devant être prises.
2. **Pour les soignants d'un patient classé « cas possible » ou « cas confirmé »**, il faut prendre les précautions complémentaires de type « air » ainsi que de type « contact » selon les modalités suivantes :
 - Le port d'un masque de protection respiratoire de type FFP2 avec vérification de l'étanchéité (il faut aussi bien ajuster le masque) pour tout soignant avant d'entrer dans le box ou la chambre. *Lorsqu'un masque est mouillé ou souillé, il sera nécessaire d'en changer immédiatement*;
 - La protection de sa tenue professionnelle par une surblouse à usage unique à manches longues : cette surblouse sera imperméable si réalisation de soins mouillants ou souillants
 - La prévention d'une éventuelle projection dans les yeux par le port systématique de lunettes de protection ;
 - Le port d'une protection complète de la chevelure (charlotte, calot couvrant, ...)
 - La réalisation avec une rigueur absolue des gestes d'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ;
 - Les indications du port de gants à usage unique reste limitées aux situations de contact ou de risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, une muqueuse ou la peau lésée ;
 - L'élimination de ces équipements de protection individuelle avant de quitter la salle/le box, sauf pour les lunettes, le masque et la coiffe qui seront retirés après la sortie du box ou de la salle.

Le professionnel de santé doit procéder à une désinfection rigoureuse:

- Des dispositifs médicaux dès leur sortie de la chambre ;
- De l'environnement proche du patient (sa chambre) à minima quotidiennement selon la technique et avec les produits habituels : le soignant en charge de cette désinfection doit respecter les recommandations de protection ci-dessus.

