وزارة الصحة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵡⵉⵜ
Ministère de la Santé

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Royaume du Maroc

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE - Direction de la Population

PROTOTCOLE DE PRISE EN CHARGE DES CAS DE COVID-19 CHEZ L'ENFANT DE 1 MOIS A 18 ANS

Prise en charge des cas possibles ou confirmés de l'infection Covid-19 chez l'enfant au Maroc

Enfant asymptomatique

Hospitalisation dans une structure dédiée aux cas Covid-19

- Isolement
- Surveillance clinique

**** Bilan initial**
- **Hémogramme, CRP, Urée, créatinine, glycémie, Kaliémie, transaminases, CPK-LDH, TP/TCA, ECG,**
- **Radiographie thoracique,**
- **Scanner thoracique**

- **Chloroquine (Nivaquine*) : Comprimé à 100 mg**
  - **10 mg/kg (max 600 mg) à J1 en 2 prises et 5 mg/kg/j (max 300 mg) dès J2 en 2 prises et pendant 10 jours**

OU

- **Hydroxychloroquine (Plaquenil*) : Comprimé à 200 mg**
  - **< 4 ans : 5 mg/kg/jour en deux prises pendant 10 jours**
  - **> 4 ans : 10 mg/Kg/jour en deux prises pendant 10 jours**

+

- **Azithromycine : Cp à 500 et 250 mg ou suspension buvable à 40 mg/ml**
  - **20mg/kg/j à J1 puis 10mg/Kg/J pendant 4 jours en prise unique**

Enfant symptomatique

Hospitalisation, isolement et recherche des signes de gravité*

Absence de signes de gravité

Forme légère = IRA haute

- Paracétamol
- Surveillance

Forme modérée = IRA basse

- Bilan initial**
- Antibiothérapie en cas de surinefction
- Chloroquine OU Hydroxychloroquine + Azithromycine

Présence de signes de gravité

Hospitalisation en unité de soins intensifs

- Bilan initial** + Echo coeur + D.dimeres
- Chloroquine OU Hydroxycloroquine + Azithromycine
- En cas d'échec : discuter Lopinavir + Ritonavir
- Oxygénothérapie
- Ventilation assistée

***Critères de gravité :**
- **Troubles de conscience**
- **Polypnée importante**
- **Apnées et/ou épuisement respiratoire**
- **Saturation en oxygène <92%**
- **Augmentation rapide des besoins en oxygène**
- **Instabilité hémodynamique**

Critères de guérison :
1. Disparition des signes cliniques liés au virus avec apyrexie depuis 3 jours ; **ET**
2. Deux prélèvements moléculaires négatifs à J9 et à j10, si pas de négativation refaire deux autres prélèvements à j14 et à j 15.

IMPORTANT : -Ces recommandations pourraient être modifiées en fonction de l'évolution épidémiologique nationale et des données scientifiques.
-Pour les définitions, se référer aux Circulaires élaborées par la DELM dans ce sens.

وزارة الصحة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵡⵉⵜ
Ministère de la Santé

Elaboré par la Direction de la Population 2020